



Đưng

Tên khác: Đước xanh, Đước nhọn

Tên khoa học: *Rhizophora mucronata* Lam.

Họ Đước: Rhizophoraceae

Hình thái:

Cây gỗ lớn, cao khoảng 20m, rễ chân nhôm xòe rộng. Lá đơn, mọc đối, phiến hình xoan rộng, xanh lục tươi, mặt dưới nhiều chấm đen, đầu lá có gai nhọn; lá kèm màu trắng ngà.

Hoa tự xim, phân nhánh 2-3 lần, gồm 4-8 hoa. Cánh hoa 4, màu trắng ngà, nhiều lông tơ; nhị 8.

Quả màu nâu, phần gốc phù, có 4 đài tồn tại; trụ mầm to, dài 50-90cm.

Mùa hoa: tháng 5-8; quả chín: tháng 7-10.

Sinh thái:

Mọc trên đất bùn hơi chặt, thủy triều lên xuống hàng ngày. Đưng và Đước đôi thường là những loài cây chiếm ưu thế ở rừng ngập mặn.

Loài cây ngập mặn thực sự.

Phân bố:

- Thế giới: phổ biến ở ven bờ biển nhiệt đới, các đảo của Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình dương, Đông Nam Á, Đông Bắc Úc,...

- Việt Nam: chủ yếu ở RNM ven biển từ Nghệ An trở vào Nam bộ.

- Khánh Hòa: phân bố ở đầm Môn, đầm Nha Phu, đầm Thủy Triều,...

Tình trạng bảo tồn: Do bị chặt phá nên hiện tại chỉ mọc rải rác, cần được bảo vệ và gây trồng phục hồi, tạo thành vành đai phòng hộ quanh các đầm vịnh.

Công dụng:

Gỗ đưng sử dụng trong xây dựng và chất đốt.

Vỏ cây có nhiều tanin dùng để nhuộm lưới và thuộc da.

Quả non có thể ăn được (dùng như rau).

Theo YHCT: vỏ cây đưng làm thuốc cầm máu và trị tiêu chảy.

Tại Ấn Độ, dùng điều trị bệnh tiểu đường.

Cây Đưng có vai trò phòng hộ, chống xói mòn ven bờ đầm vịnh và là thành phần quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn Khánh Hòa./.

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA



Hình 1: Đưng (*Rhizophora mucronata*) – Rừng ngập mặn Hà Liên



Hình 2&3: Đưng – Rừng ngập mặn Hà Liên



Hình 4: Đưng – Lá & lá kèm



Hình 5: Đưng – Hoa



Hình 6: Đưng – Quả non



Hình 7&8: Đưng – Quả trưởng thành