Đủng đỉnh

Tên khác: Đùng đình
Tên khoa học: *Caryota mitis* Lour.
Họ Cau: Arecaceae
Hình thái:
Thân hình trụ, cao khoảng 6m, thường mọc thành bụi. Thân do các bẹ lá tạo thành và để lại nhiều sợi bám. Lá kép lông chim hai lần, dài đến 2 m; gồm nhiều lá chét có phiến hình thoi hoặc tam giác lệch.
Cụm hoa gồm 4 - 6 mo, mo là lớp vỏ bẹ cứng bên ngoài có chức năng che chở cho các bông mo. Bông mo dài 40-60cm, gồm nhiều nhánh, mang hoa dày đặc. Hoa đơn tính cùng gốc, mỗi hoa cái giữa 2 hoa đực. Hoa cái hình chóp ngắn, mẫu 3 (đài 3 và tràng 3). Quả hình cầu, đường kính 1,5cm, màu đen, gốc có đài tồn tại, 1 hạt.
Mùa hoa, quả: từ tháng 3-12.
Sinh thái:
Mọc nhiều ở vùng núi, lên đến độ cao 1.500m, hoặc dưới tán rừng.
Phân bố:
- Thế giới: chủ yếu ở các nước nhiệt đới châu Á;
- Việt Nam: phổ biến khắp cả nước, dọc theo dải Trường Sơn;
- Khánh Hòa: các vùng núi vừ Vạn Ninh, Ninh Hòa, Hòn Hèo, đến Khánh Sơn.

Tình trạng bảo tồn: Phạm vi phân bố rộng, không có nguy cơ.
Công dụng:
Chồi ngọn có thể ăn như rau.
Lưu ý: Trái đủng đỉnh rất ngứa nên tránh tiếp xúc.

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA

HÌNH ẢNH




Hình 1&2: Đủng đỉnh (*Caryota mitis*) – Thân và cành lá



Hình 3: Đủng đỉnh – Trái non