Cáp chưn rít

Tên khác: Cáp thơm
Tên khoa học: *Capparis beneolens* Gagnep.
Họ Màng màng: Capparaceae

Hình thái:

Dây leo có gai móc, chiều dài thân 6-7m, cành nhánh nhỏ. Lá đơn, mọc cách, phiến lá nhỏ và dày, hình xoan, dài 3-4cm, đầu lá có gai nhắn, lúc non có lông. Hoa nhỏ, mọc cụm ở nách lá, rộng 1cm, cánh hoa màu trắng; nhị hoa 6-7. Quả thịt hình cầu, nhỏ khoảng 8mm.

Mùa hoa, quả: từ tháng 1-3.

Sinh thái:

Thường mọc ở ven biển, trên đất cát, nơi có nhiều đá lộ. Chịu được khô hạn.

Phân bố:

- Thế giới: Chưa có ghi nhận;
- Việt Nam: Loài cây đặc hữu của Việt Nam, ở khu vực Nam Trung bộ;
- Khánh Hòa: Bán đảo Hòn Hèo, Hòn Tre, Hòn Thị.

Tình trạng bảo tồn: Loài cây đặc hữu, phạm vi phân bố hẹp, có giá trị về mặt đa dạng sinh học.

Công dụng:

Chi *Capparis* gồm nhiều loài có tiềm năng về dược liệu. Loài cây này có thể định hướng nghiên cứu trong thời gian tới./.

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA

HÌNH ẢNH



Hình 1: Cáp chưn rít – Cành nhỏ có gai móc



Hình 2: Cáp chưn rít



Hình 3: Cáp chưn rít – Leo bám trên các cây gỗ